

## Kampania żniwna w Gminie Szprotawa w 2025 roku

Analizując tegoroczną kampanię żniwną oraz aktualny stan na rynku zbożowym należy stwierdzić, że w obecnej chwili są problemy ze zbyciem zbóż i rzepaku, gdyż panują niskie ceny skupu, niższe jak w roku 2024.

Ceny skupowanego zboża z tegorocznej kampanii żniwnej przedstawiają się następująco (średnie dane z dnia 16.10.2025 r. z Portalu Topagrar rynki rolne - zboża):

|                         |   |                       |
|-------------------------|---|-----------------------|
| - pszenica konsumpcyjna | – | 706 zł netto/1 tonę,  |
| - pszenica paszowa      | – | 652 zł netto/1 tonę,  |
| - żyto konsumpcyjne     | – | 548 zł netto/ 1 tonę, |
| - żyto paszowe          | – | brak danych,          |
| - jęczmień paszowy      | – | 614 zł netto/ 1 tonę, |
| - pszenżyto paszowe     | – | 600 zł netto/1 tonę,  |
| - owies                 | – | brak danych,          |
| - kukurydza sucha       | – | 678 zł netto/1 tonę   |
| - kukurydza mokra       | – | 416 zł netto/1 tonę.  |

Powracając do skupu zbóż z tegorocznej kampanii żniwnej na naszym terenie, zajmuje się nim firma „Napena” Sp. z o. o. z Szamotuł, która jest właścicielem elewatora w Szprotawie na ul. Przejazdowej 7.

Firma „Napena” potwierdziła, że skupuje żyto, pszenicę, pszenżyto, jęczmień, rzepak i do dnia 20 października br. skupiła ona: 113 ton pszenicy konsumpcyjnej, 1.510 t pszenicy paszowej, 275 ton pszenżyta paszowego, 100 ton żyta paszowego, 75 ton jęczmienia paszowego oraz 2.600 ton rzepaku.

Elewator ww. firmy na terenie Szprotawy dysponuje pojemnością magazynową wynoszącą 13 000 ton, ta pojemność magazynowa jest w zupełności wystarczająca dla naszych producentów, jak i również dla producentów z ościennych gmin tj. Niegosławic i Malomic.

Przyjmując naszą strukturę zasiewów, w której zboża stanowią ok. 80% tj. 8 000 ha, produkcja globalna wyniosła ok. 20 000 ton (przy plonie ok. 25q/ha), a towarowa odpowiednio 5 000 ton pszenicy i 3 500 ton żyta.

Odnosnie skupu rzepaku większość rolników z naszej Gminy ma zawarte umowy kontraktacyjne z firmą „Napena”, która skupiła 2.600 ton rzepaku z tegorocznych zbiorów.

Ogólny obszar zakontraktowanej powierzchni wyniósł ok. 1 350 ha i był porównywalny do powierzchni w roku 2024.

Szacuje się, że w produkcji towarowej rzepaku wyniosła ok. 3 000 ton. Firma „Napena” w czasie zbiorów rzepaku płaciła ok. 2.000 zł netto/1 tonę.

Przy zakupie zbóż i rzepaku obowiązują producentów ustalone minimalne parametry jakościowe, stąd też w załączeniu przedstawiam przykładowe minimalne parametry jakościowe zbóż.

Pragnę również poinformować, że na terenie wsi Borowina 61c w istniejących magazynach prowadzony jest skup zbóż (pszenżyto, pszenica, jęczmień, żyto i owies) przez właściciela firmy „Drew Met” ze Szprotawy, który do dnia 20 października br. skupił od rolników ryczałtowych: 300 ton pszenżyta, 50 ton żyta, 200 ton pszenicy, 350 ton owsa, 8 t łubinu oraz 130 ton grochu.

Dodatkowo firma Frankiewicz w Nowym Miasteczku w czasie kampanii żniwnej skupowała zboża od naszych rolników.

**BURMISTRZ**  
**Mirosław Gąsik**

Sporządził:  
Dariusz Jakubiak  
insp. ds. rolnictwa

*[Signature]*

**KIEROWNIK WYDZIAŁU**

*[Signature]*  
**Piotr Wciórka**

### Minimalne parametry jakościowe zbóż przy sprzedaży

| Wskaźnik                                                                   | Pszenica | Jęczmień | Kukurydza |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| A. Maksymalna wilgotność                                                   | 14,5%    | 14,5%    | 14,5%     |
| B. Maksymalna zawartość (%) zanieczyszczeń                                 | 12%      | 12%      | 12%       |
| 1. Ziarna połamane                                                         | 5%       | 5%       | 10%       |
| 2. Zanieczyszczenia ziarnowe, w tym:                                       |          |          |           |
| a) ziarna poślednie                                                        |          |          |           |
| b) ziarna innych zbóż                                                      |          |          |           |
| c) ziarna uszkodzone przez szkodniki                                       |          | 5%       |           |
| d) ziarna z odbarwionym zarodkiem                                          |          | -        | -         |
| e) ziarna uszkodzone termicznie                                            | 0,5%     | 3%       | 3%        |
| 3. Ziarna porośnięte                                                       | 4%       | 6%       | 6%        |
| 4. Materiał obcy, w tym:                                                   | 3%       | 3%       | 3%        |
| a) nasiona obce:                                                           |          |          |           |
| - szkodliwe                                                                | 0,10%    | 0,10%    | 0,10%     |
| - pozostałe                                                                |          |          |           |
| b) ziarna zniszczone:                                                      |          |          |           |
| - ziarna uszkodzone wskutek samozagrzewania lub zbyt intensywnego suszenia | 0,05%    |          |           |
| - inne                                                                     |          |          |           |
| c) materiał obcy nieorganiczny                                             |          |          |           |
| d) plewy                                                                   |          |          |           |
| e) sporysz                                                                 |          |          |           |
| f) ziarna zbutwiałe                                                        | 0,05%    |          |           |
| g) martwe owady lub ich fragmenty                                          |          |          |           |
| C. Minimalna gęstość ziarna w stanie zsypanym (kg/hl)                      | 73       | 62       | -         |
| D. Minimalna zawartość białka od sezonu 2002/2003 (¹)                      | 10,5%    | -        | -         |
| E. Minimalna liczba opadania (sek.)                                        | 220      |          |           |
| F. Minimalny wskaźnik sedymentacyjny Zeleny'ego (ml) (²)                   | 22       | -        | -         |

Objaśnienia:

(¹) - % w suchej masie

(²) – w przypadku, gdy wskaźnik sedymentacyjny Zeleny'ego wynosi między 22 a 30 istnieje konieczność wykonania testu na kleistość ciasta. Zboże zostaje zaakceptowane do interwencji, jeśli otrzymane z niego ciasto ocenia się jako niekleiste, nadające się do obróbki mechanicznej.